

# Rougeole, oreillons, rubéole

Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner




PROTÉGEONS-NOUS,  
VACCINONS-NOUS.



Caisse de  
PRÉVOYANCE SOCIALE  
Saint-Pierre et Miquelon



MINISTÈRE CHARGÉ  
DE LA SANTÉ



## La rougeole, les oreillons et la rubéole sont trois maladies très contagieuses dont les complications peuvent être graves.

La vaccination est le moyen de protection le plus efficace.

### Entre 2008 et 2012,

une importante épidémie de rougeole a atteint plus de 24 000 personnes, causant plus de 30 complications neurologiques et 10 décès en France.


### Qu'est-ce que la rougeole, les oreillons et la rubéole ?

Ces maladies sont dues à des virus qui se transmettent très facilement par la toux ou les éternuements. Une personne contaminée par un de ces trois virus est contagieuse avant même de se sentir malade.

**La rougeole** commence par une fièvre élevée, une toux, des yeux rouges qui pleurent, ensuite des petites taches rouges qui apparaissent sur la peau. Il peut y avoir des complications – pneumonies, atteintes du cerveau, convulsions – qui nécessitent une hospitalisation, en particulier chez les tout-petits, les adolescents et les jeunes adultes.

**Les oreillons** provoquent de la fièvre et un gonflement douloureux des glandes salivaires (ces glandes produisent la salive). Il peut y avoir des complications graves : méningite, surdit , atteinte des testicules avec risque de st rilit  chez le gar on.

**La rub ole** peut provoquer des douleurs dans les articulations, des ganglions puis des boutons qui commencent sur le visage. C'est une maladie tr s dangereuse chez la femme enceinte car elle peut  tre responsable de malformations chez le futur b b . C'est pourquoi il est indispensable que toutes les femmes en  ge d'avoir des enfants soient vaccin es.



## Qui doit être vacciné ?

**Tous les enfants** avec 2 injections de vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) : la première à l'âge de 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois.

**Les personnes nées à partir de 1980** : pour être protégées, les personnes doivent avoir reçu au total 2 injections.

## Quels sont les effets secondaires ?

Le vaccin est bien toléré. Un enfant sur 10 peut avoir de la fièvre, parfois accompagnée de petites taches rouges sur la peau, entre 5 et 12 jours après l'injection.

Une réaction (rougeur, gonflement) à l'endroit de la piqûre est possible, mais rare.

## Le vaccin est-il remboursé ?

Le vaccin ROR est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie pour tous les enfants jusqu'à 17 ans inclus. Ensuite, il est remboursé à 65%.

## Où se faire vacciner ?

Adressez-vous au médecin de votre choix : votre médecin généraliste, le pédiatre de votre enfant ou votre sage-femme. Les infirmières peuvent aussi vacciner sur prescription médicale. Vous pouvez également aller dans un centre de protection maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans) ou dans un centre de vaccination.

—→  
**2 injections  
suffisent** pour  
être protégé contre  
ces trois maladies.

—◆—

**Une question,  
un conseil ?  
Parlez-en  
à votre médecin  
ou votre  
pharmacien.**

◆————◆

### **Un vaccin efficace**

Le vaccin ROR permet d'éviter d'attraper la rougeole, les oreillons et la rubéole. Il protège ainsi des complications graves de ces trois maladies.

### **Un vaccin nécessaire**

Se vacciner, c'est nécessaire pour soi mais aussi pour protéger les plus fragiles, qui ne peuvent pas être vaccinés, par exemple les nourrissons de moins de 1 an et les femmes enceintes.

### **Un vaccin simple**


2 injections à un mois d'intervalle suffisent pour être protégé.

### **Un vaccin sans danger**

Une fièvre et des rougeurs sur la peau peuvent parfois survenir dans les jours suivant l'injection.

### **Un vaccin gratuit**

L'Assurance maladie prend en charge le vaccin à 100% pour tous les enfants jusqu'à 17 ans inclus (65% au-delà de cet âge).



Caisse de  
**PRÉVOYANCE SOCIALE**  
Saint-Pierre et Miquelon